

NOS DONNEES : INCIDENCE 2016-2020

| | HOMMES | | | FEMMES | | |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | Nombre moyen de cas par an | TIS M ¹ | IC 95% TIS M | Nombre moyen de cas par an | TIS M ¹ | IC 95% TIS M |
| Tumeurs solides | 1983 | 333,5 | [326,7;340,3] | 1785 | 258,8 | [252,9;264,7] |
| Lèvre, bouche, Pharynx | 122 | 22,4 | [20,6;24,2] | 43 | 6,5 | [5,5;7,4] |
| Oesophage | 49 | 8,4 | [7,2;9,4] | 18 | 2,1 | [1,6;2,6] |
| Estomac | 39 | 6,5 | [5,5;7,4] | 21 | 2,4 | [1,9;3,0] |
| Intestin grêle | 12 | 2,2 | [1,6;2,7] | 9 | 1,1 | [0,8;1,5] |
| Colon-rectum | 244 | 39,6 | [37,2;41,8] | 223 | 26,2 | [24,4;27,9] |
| Foie | 91 | 15,3 | [13,8;16,7] | 37 | 4,3 | [3,6;5,0] |
| Voie biliaire | 14 | 2,0 | [1,4;2,4] | 15 | 1,4 | [1,0;1,8] |
| Pancréas | 61 | 9,8 | [8,6;11,4] | 67 | 7,6 | [6,7;8,5] |
| Larynx | 30 | 5,2 | [4,3;6,0] | 8 | 1,1 | [0,8;1,5] |
| Poumon | 349 | 58,1 | [55,2;60,8] | 145 | 20,8 | [19,2;22,5] |
| Mésothéliome de la plèvre | 8 | 1,1 | [0,7;1,4] | 3 | 0,2 | [0,1;0,4] |
| Sein | | | | 710 | 111,6 | [107,6;115,5] |
| Col de l'utérus | | | | 37 | 6,7 | [5,7;7,8] |
| Corps de l'utérus | | | | 74 | 9,4 | [8,4;10,4] |
| Ovaire | | | | 58 | 8,3 | [7,3;9,4] |
| Mélanome de la peau | 77 | 13,9 | [12,4;15,3] | 80 | 13,2 | [11,8;14,6] |
| Prostate | 518 | 84,9 | [81,5;88,2] | | | |
| Testicule | 28 | 6,4 | [5,3;7,4] | | | |
| Vessie | 99 | 15,0 | [13,6;16,3] | 24 | 2,4 | [1,9;2,9] |
| Rein | 91 | 16,0 | [14,5;17,5] | 47 | 6,6 | [5,6;7,6] |
| Système nerveux central | 34 | 6,9 | [5,7;8,0] | 23 | 4,2 | [3,3;5,1] |
| Thyroïde | 24 | 4,8 | [3,8;5,6] | 60 | 11,4 | [10,0;12,7] |
| Sarcomes | 27 | 4,9 | [4,0;5,7] | 23 | 3,7 | [2,7;4,7] |
| Sarcomes des tissus mous | 12,8 | 2,3 | [1,7;2,9] | 12,6 | 2 | [1,5;2,5] |
| Sarcomes osseux | 3,6 | 0,8 | [0,4;1,1] | 1,6 | 0,4 | [0,1;0,6] |
| Hémopathies malignes | 255 | 43,6 | [41;46,1] | 227 | 29,9 | [28;32] |
| Lymphome de Hodgkin | 16 | 3,5 | [3,0;4,6] | 15 | 3,8 | [3,0;4,4] |
| Lymphome Malin Non Hodgkinien | 147 | 25,5 | [23,4;27,4] | 119 | 15,6 | [14,1;17,0] |
| LLC ² / lymphome lymphocytaire | 27 | 4,3 | [3,5;5,0] | 17 | 2,1 | [1,6;2,6] |
| Lymphome folliculaire | 13 | 2,3 | [1,7;2,8] | 13 | 2,0 | [1,4;2,5] |
| Lymphome diffus à grandes cellules B | 27 | 4,7 | [3,9;5,5] | 20 | 2,7 | [2,1;3,3] |
| Lymphome à cellules du manteau | 6 | 0,9 | [0,5;1,2] | 2 | 0,2 | [0,1;0,4] |
| Lymphome de la zone marginale | 12 | 2,1 | [1,5;2,6] | 13 | 1,9 | [1,4;2,4] |
| Myélome multiple et plasmocytome | 28 | 4,3 | [3,5;5,0] | 31 | 3,4 | [2,8;4,0] |
| LLP ³ / Macroglobulinémie de Waldenström | 10 | 1,5 | [1,1;1,9] | 4 | 0,5 | [0,2;0,7] |
| Lymphome T/NK à cellules matures | 11 | 2,1 | [1,5;2,7] | 8 | 1,2 | [0,8;1,6] |
| Leucémie/lymphome lymphoblastique B, T, SAI | 6 | 1,8 | [1,1;2,5] | 5 | 1,3 | [0,8;1,9] |
| Leucémie aiguë myéloïde | 16 | 2,7 | [2,1;3,3] | 18 | 2,6 | [2,0;3,3] |
| Leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire | 2 | 0,4 | [0,1;0,6] | 2 | 0,4 | [0,1;0,7] |
| Syndrome myéloprolifératif chronique | 35 | 6,1 | [5,1;7,0] | 37 | 4,5 | [3,8;5,3] |
| Leucémie myéloïde chronique | 8 | 1,6 | [1,0;2,0] | 5 | 0,7 | [0,4;1,0] |
| Autre syndrome myéloprolifératif chronique | 27 | 4,6 | [3,7;5,3] | 33 | 3,8 | [3,1;4,5] |
| Syndrome myélodysplasique | 26 | 3,3 | [2,7;3,9] | 25 | 2,4 | [1,9;2,9] |
| Leucémie myélomonocytaire chronique et autres | 11 | 1,5 | [1,0;1,9] | 10 | 0,9 | [0,6;1,1] |

1 Taux d'incidence standardisé sur la population mondiale, pour 100 000 personnes-année et son intervalle de confiance à 95%

2 LLC : Leucémie lymphoïde chronique

3 LLP : Lymphome lympho-plasmocyttaire